

ПОМНИТЕ:

- Любые контакты с дикими и безнадзорными домашними животными опасны.

- 93% людей, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов, пострадали из-за неправильного содержания домашних животных. Особенно опасны бездомные, бродячие и содержащиеся без достаточного надзора собаки.

- **Если вас укусило**, оцарапало, ослунило **любое животное**, даже внешне здоровое, а тем более безнадзорное либо дикое, следует немедленно обильно промыть рану в течение 10-15 минут насыщенным мыльным раствором, обработать место повреждения йодной настойкой и наложить стерильную повязку. Опасно высасывать кровь из раны ртом. Не нужно прижигать рану.

- После самостоятельно проведенной обработки места повреждения в самые сжатые сроки необходимо обратиться в **ближайшее медицинское учреждение** для проведения первичной хирургической обработки раны и решения вопроса о необходимости проведения профилактической вакцинации против бешенства.

- По возможности следует собрать максимум данных о покусавшем животном (описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника, хозяина, обстоятельства укуса и др.). Если животное домашнее (собака или кошка) и привито против бешенства, то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о прививке.

- Своевременно сделанные прививки предохранят вас от заболевания бешенством.

- **Самовольные перерывы в проведении вакцинации**, прекращение и сокращение курса прививок, назначенных врачом, **недопустимы**, т.к. выработка иммунитета в таких случаях запаздывает и возникает опасность заболевания.

- **Вакцинация** против бешенства **домашних животных** и соблюдение правил их содержания и выгула – важнейшие условия предупреждения заражения бешенством не только животного, но и человека!

- Прививки против бешенства животным проводятся во всех ветеринарных учреждениях.

Бешенство – смертельное заболевание, но его можно избежать!

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА



(Памятка для населения)

БЕШЕНСТВО (*рабес, водобоязнь, гидрофобия*) – опасное заболевание животных и человека, вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и развивается прогрессирующее смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Вирус бешенства содержится в слюне больного животного и передается при укусе. Заболевание неизлечимо, однако его можно предупредить своевременно проведенным курсом лечебно-профилактических прививок.

Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь - плотоядные животные. Могут также болеть птицы, грызуны, летучие мыши.

Наибольшую опасность для человека представляют домашние животные, в первую очередь кошки и собаки.

Домашние кошки, обладающие свободным, независимым нравом, могут уходить на значительные расстояния от дома и контактировать с бешеными дикими животными.

Собаки, охраняя подворье, часто нападают на диких животных, проникающих в населенные пункты, и заражаются от них.

Случаи заражения человека после контакта с больными **сельскохозяйственными животными** встречаются значительно реже.

Домашние птицы, хотя и могут заболеть бешенством, не способны заразить человека из-за отсутствия у них слюнных желез.

У собак и кошек **бешенство протекает в двух формах** – буйной и тихой.

При буйной форме животное становится агрессивным, прячется по углам, убегает из дома, заглатывает несъедобные предметы (щепки, камни и т.д.), из-за зуда разгрызает зажившую рану, нанесенную бешеным животным. Его голос сипнет или совсем пропадает. Водобоязнь не является характерным признаком бешенства у собак. Это очень важно, так как некоторые люди, видя, что собака не боится воды (пьет воду, переплывает реку и т.д.), считают ее здоровой и при укусе, оцарапывании или ослюнении такой собакой не принимают предохранительных мер, не обращаются за медицинской помощью.



Тихая форма бешенства имеет стертое течение: больное животное смирное, не реагирует на раздражители, отказывается от еды, но при этом нередко подкрадывается к человеку и кусает его

В любом случае при заболевании нормальное поведение животного меняется, что должно настораживать владельцев и являться причиной визита к ветеринару.



ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИСХОДИТ:

- при укусе и проникновении в рану слюны больного животного;
- при попадании слюны на слизистые оболочки глаз, носа, рта, на поврежденные кожные покровы;
- при оцарапывании, нанесенном когтями (животные часто лижут лапы, поэтому на когтях остается достаточное для заражения количество слюны);
- во время снятия шкур с больных животных.

Необходимо знать, что слюна животных становится заразной уже за 10 дней до проявления болезни. Поэтому, если человека укусило животное, ни в коем случае нельзя его убивать в течение ближайших 10 дней, т.е. срока, необходимого для ветеринарного наблюдения.

У человека инкубационный период бешенства составляет обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до 1 года и более.

Первые **симптомы заболевания** могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, субфебрильная температура. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.